

2023 年竹溪县事业单位公开招聘工作人员笔试模拟卷

(医疗岗)

注意事项

1. 本科目满分 100 分，时限 150 分钟。
2. 请在本科目答题卡的指定位置按要求填写（涂）姓名和准考证号。
3. 请用黑色字迹的签字笔或钢笔在答题卡的指定区域内作答，超出答题区域的，作答无效。在题本上作答无效。
4. 所有题目一律使用现代汉语作答，未按要求作答的，不得分。
5. 监考人员宣布考试结束时，考生应立即停止答题，将题本、答题卡和草稿纸整理好放在桌面上，待监考人员清点无误后，方可离开。

科目一：医学基础知识

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，共 40 题，每小题 0.9 分，共 36 分）

1. 不出现蛋白质中的氨基酸是：

- A. 半胱氨酸
- B. 胱氨酸
- C. 瓜氨酸
- D. 精氨酸

2. 钱某因胃癌去某三甲医院就诊，期望“重获新生”。接诊医生在仔细了解钱某的病情和想法后，客观地说明了胃癌目前临床治疗的现状，并告知其手术治疗过程中可能出现的风险及术后并发症，根据医患关系模式伦理，医生和钱某的上述沟通属于：

- A. 医患认知互动
- B. 医患情感互动

C.医患意志互动 D.医患行为互动

3.《母婴保健法》规定，医疗保健机构依照规定开展婚前医学检查、遗传病诊断、产前诊断以及施行结扎手术和终止妊娠手术的，必须符合国务院卫生行政部门规定的条件和技术标准，并经（ ）许可。

- A.县级以上地方人民政府卫生行政部门
- B.省市级以上地方人民政府卫生行政部门
- C.县级以上地方人民政府
- D.国家卫生行政部门

4.有关红骨髓正确的是：

- A.成人存在于髓腔内
- B.不存在于板障内
- C.胎儿期造血，成年期不造血
- D.髌骨、胸骨、椎骨内终生保存红骨髓

5.刺激胰岛素分泌的最主要因素是：

- A.胃泌素释放
- B.迷走神经兴奋
- C.血糖浓度升高
- D.血氨基酸浓度升高

6.利尿药氢氯噻嗪降低血压的初期机制可能是：

- A.降低血管对缩血管剂的反应性
- B.增加血管对扩血管剂的反应性
- C.降低动脉壁细胞的 Na^+ 含量
- D.排钠利尿、降低血容量

7.下述哪项支持胃的恶性溃疡：

- A.溃疡呈圆形或椭圆形
- B.边缘整齐，不隆起
- C.底部较平坦
- D.火山口状，底部凹凸不平

8.二战期间，被围困在列宁格勒达三年之久的人，高血压患病率从战前 4%上升到 64%。此种现象表明，导致高血压发病率激增的心理社会因素是：

- A. 负性因素
 - B. 慢性应激
 - C. 不良行为因素
 - D. 精神障碍
9. 人体内 CO_2 通过细胞膜的方式是：
- A. 单纯扩散
 - B. 易化扩散
 - C. 原发性主动转运
 - D. 继发性主动转运
10. 肝硬化患者易发生凝血障碍和出血现象，其主要原因是：
- A. 凝血因子合成减少
 - B. 血小板生成减少
 - C. 维生素 K 缺乏
 - D. 抗凝血酶灭活延缓
11. 某人的红细胞与 B 型血的血清凝集，其血清与 B 型血的红细胞不凝集，此人血型为：
- A. A 型
 - B. B 型
 - C. AB 型
 - D. Rh 阳性
12. 窦房结细胞动作电位 0 期去极化是由于：
- A. Cl^- 内流
 - B. Ca^{2+} 内流
 - C. Na^+ 内流
 - D. K^+ 内流
13. 下列状态不属于病理性充血的是：
- A. 发生炎症的局部软组织变红
 - B. 突然解开包扎肢体的绷带时
 - C. 腹水压迫的腹腔内脏器一次性大量抽取腹水后
 - D. 妊娠时的子宫充血
14. 一位妊娠 5 个月的妇女，空腹血糖为 11mmol/L ，除用饮食控制外，可选用哪种药物治

疗:

- A.瑞格奈特
- B.氯磺丙脲
- C.胰岛素
- D.优降糖（格列本脲）

15.8 岁农村男孩，因为腹痛就医，发现蛔虫在其肠道内相互缠绕堵塞肠腔，引起肠梗阻。

寄生虫对宿主造成的这种损害是:

- A.掠夺营养
- B.免疫损伤
- C.毒性损伤
- D.机械性损伤

16.产妇，孕 38 周，突然感到剧烈、持续腹痛伴有少量阴道出血，体格检查：血压 110/71mmHg，子宫似足月妊娠大小，硬如木板、有压痛，胎心 90 次/分，胎位不清，该患者目前最大的可能是:

- A.临产
- B.早产
- C.不完全性子宫破裂
- D.胎盘早剥

17.腹部手术后 5 天，切口搏动性疼痛，体温上升，首先考虑的并发症是:

- A.肺部感染
- B.肠粘连
- C.腹腔脓肿
- D.切口感染

18.关于苯丙酮尿症，下列说法错误的是:

- A.苯丙酮尿症是一种常染色体隐性遗传疾病
- B.是由先天性苯丙氨酸代谢障碍引起
- C.治疗原则是出现症状后技术处理
- D.患儿出生时正常，通常 3-6 个月时出现症状

19.患者，女，28 岁，突发心悸 2 小时，心率 168 次 / min，节律规则，心电图 QRS 波形正常，不宜选择的药物是:

- A.腺苷
- B.普罗帕酮
- C.利多卡因
- D.维拉帕米

20.关于癌症疼痛“三阶梯疗法”的基本原则，下列说法错误的是：

- A.首选口服给药
- B.根据药物药理特性有规律地按时用药
- C.个体化给药，根据具体患者和疗效用药
- D.患者疼痛非常剧烈时才给予药物

21.患者张某，女性，55岁，绝经3年，近几天出现下腹胀痛，有少量阴道流血，妇科检查：子宫增大，有明显触痛，为明确是否是子宫内膜癌，最常采用的诊断方法是：

- A.分段诊刮
- B.宫腔镜检查
- C.阴道后穹窿涂片
- D.B超检查

22.患者，男，35岁，突发呼吸困难伴窒息感。查体：呼吸30次/min，呼气延长，双肺哮鸣音，无湿啰音，应属于：

- A.吸气性呼吸困难
- B.呼气性呼吸困难
- C.混合型呼吸困难
- D.阵发性呼吸困难

23.呕吐与头部位置改变有密切关系的疾病是：

- A.脑炎
- B.耳源性眩晕
- C.妊娠反应
- D.尿毒症

24.意识障碍伴瞳孔散大可见于：

- A.颠茄类中毒
- B.吗啡类中毒
- C.巴比妥类中毒

D.有机磷农药中毒

25.带状疱疹是由潜伏在人体脊髓后根神经节或颅神经感觉神经节内的水痘，带状疱疹病毒，在机体抵抗力下降时被激活所致。关于该病主要的临床表现，下列描述错误的是：

- A.常伴有显著的神经痛
- B.皮损可沿某一周围神经呈片状分布，且呈双侧对称分布
- C.发疹前有乏力，低热、纳差，患处皮肤自觉灼热或灼痛
- D.患处先出现潮红斑.后演变为黄豆大小丘疹，迅速变为水疱

26.电光性眼炎或雪盲是由于电焊、高原雪地及水面反光造成的眼部紫外线损伤，紫外线对组织有光化学作用，使蛋白质凝固变性，角膜上皮坏死脱落。下列不属于眼部紫外线损伤治疗方案的是：

- A.涂抗生素以防发生感染
- B.滴用促进角膜上皮愈合的眼液
- C.滴用促进角膜上皮愈合的眼用凝胶
- D.局部激光光凝治疗

27.下肢深静脉血栓形成的相关因素不包括：

- A.久病卧床
- B.静脉损伤
- C.脾功能亢进
- D.妊娠

28.急性心肌梗死后最晚恢复正常的心肌坏死标志物是：

- A.肌红蛋白 B.肌酸肌酶
- C.肌酸肌酶同工酶 D.肌钙蛋白

29.患者，女，心脏联合瓣膜病 10 年，发热 1 个月，体温 37.2~37.6℃，厌食，消瘦，贫血貌。确诊手段首选：

- A.胸部 X 线 B.血培养
- C.测定血红蛋白 D.心肌酶检查

30.下列关于动脉血压的叙述错误的是：

- A.动脉血压是动脉内流动的血液对单位面积动脉管壁产生的侧压力
- B.心血管系统有足够的血液充盈是形成动脉血压的前提
- C.心跳暂停的实验动物仍可测到收缩压和舒张压

D.心室收缩射血为血压的形成提供能量

31.开放性气胸的急救处理，首选的措施是：

- A.清创是胸腔闭式引液
- B.胸腔穿刺
- C.吸氧、输血、补液
- D.封闭胸壁防口

32.患者李某，女性，40岁，表现为心悸失眠、头晕目眩，面色无华，月经不调、量少，舌淡脉细，应服用的方剂是：

- A.四君子汤
- B.四物汤
- C.六味地黄丸
- D.四神丸

33.男孩，5岁。出生后数月逐渐出现青紫，活动后加重。查体：胸骨左缘第3肋间可闻及3/6级喷射性收缩期杂音，胸部X线片示心稍有增大，心尖圆钝上翘，肺动脉段凹陷，上纵隔增宽，肺门血管影缩小，肺野透亮度增加，最可能的诊断是：

- A.房间隔缺损
- B.法洛三联症
- C.完全性大动脉错位
- D.动脉导管未闭

34.关于处方的有效期和用量，下列说法错误的是：

- A.处方有效期最长不能超过3天
- B.处方一般不得超过7日用量
- C.急诊处方一般不超过3日用量
- D.急诊麻醉药品注射剂处方为3天常用量

35.某工地建筑工人王某，因长时间高温作业突发头晕、头痛、心悸，开始大量出汗，送至医院急诊时，出现“无汗”，测体温高达41.2℃，伴有意识障碍、嗜睡、昏迷，经全力抢救无效后死亡，该患者所患的疾病是：

- A.热衰竭
- B.热射病
- C.热痉挛

D.高热

36.描述 200 名 7 岁男童体重数据集中趋势最常用的指标是:

A.算术平均数

B.中位数

C.四分位数间距

D.标准差

37.疾病的流行强度是指在一定时期内,某地区人群中某病发病率的变化及其病例间的联系程度,下列不属于描述疾病流行强度常用术语的是:

A.散发

B.分布

C.流行

D.暴发

38.张某,男,35岁,从事采矿工作10年,其职业因素最可能导致的疾病是:

A.血液系统疾病

B.呼吸系统疾病

C.皮肤疾病

D.中枢神经系统疾病

39.郭双,男,9岁。2周前出现咳嗽、咳痰,近日来出现发热、少尿和血尿。尿常规检查可见管型及轻度蛋白尿。提示患儿出现了下列哪个疾病,主要受累部位是:

A.急性弥漫性增生性肾小球肾炎:肾小球

B.微小病变性肾小球病:肾小管

C.急进性肾小球肾炎:肾小球

D.急性弥漫性增生性肾小球肾炎:肾小管

40.50岁女性,因不规则阴道流血2月就诊,绝经2年,G1P1。妇科查体:阴道粘膜萎缩,宫颈光滑、无举痛,子宫中位,正常大小,活动无压痛,双侧附件(-)。需进一步完善哪项检查?

A.宫颈镜下取活体

B.盆腔CT

C.诊刮

D.B超

二、多项选择题(在每小题的多个备选答案中,选出两个或两个以上正确的答案,多选、少选、错选均不得分。共 10 题,每小题 1.2 分,共 12 分)

41.尘肺是职业性疾病中影响面最广、危害最严重的一类疾病,下列关于尘肺的描述正确的有:

- A.是由于在生产环境中长期吸入生产性粉尘而引起的以肺组织纤维化为主的疾病
- B.尘肺病例是占我国职业病总人数比例最高的
- C.我国按病因将尘肺分为矽肺、硅酸盐肺、炭尘肺、混合性尘肺和金属尘肺五类
- D.某些粉尘本身是或者含有人类肯定致癌物,放射性粉尘也能引起呼吸系统肿瘤

42.下列关于淋巴液的说法,正确的有:

- A.淋巴液回流有助于回收组织液中的蛋白质
- B.淋巴液在体外能够凝固
- C.淋巴液的蛋白质含量一般比血液的蛋白质含量高
- D.淋巴液回流有助于将小肠吸收的脂肪运送至循环血液

43.氨基糖苷类抗生素的主要不良反应不包括:

- A.抑制骨髓
- B.耳毒性
- C.肝毒性
- D.心脏毒性

44.发热的类型,错误的是:

- A.急性肾炎常见间歇热
- B.霍奇金病常见稽留热
- C.疟疾常见弛张热
- D.伤寒呈波状热

45.关于肝素的描述,正确的是:

- A.体内有抗凝作用
- B.体外有抗凝作用
- C.抗凝机制与其激活抗凝血酶III有关
- D.可用于防止血栓形成和扩大

46.关于硝酸甘油,正确的是:

- A.通过 EDRF 使血管平滑肌松弛
- B.降低左室舒张末期压力

- C.舒张冠脉侧支血管
- D.降低心肌耗氧量

47.地西洋具有以下哪种作用？

- A.镇静
- B.止痛
- C.抗焦虑
- D.抗精神分裂

48.下列各项，不属于医师执业活动中应履行的义务是：

- A.接受继续医学教育
- B.享受国家规定的医学待遇
- C.遵守技术操作规范
- D.遵守法律、法规，遵守技术操作规范

49.下列选项中属于基层卫生机构对严重精神障碍患者康复的义务的是：

- A.严格控制患者出行和用药
- B.建立严重精神障碍患者的健康档案
- C.对在家居住的严重精神障碍患者进行定期随访
- D.指导患者服药和开展康复训练

50.下列选项中，属于腹膜外位器官的有：

- A.阑尾
- B.充盈的膀胱
- C.输尿管
- D.肾

三、判断题(对你认为正确的题目填涂“A”，认为错误的题目填涂“B”。并将答案填入答题纸的相应表格内。共 20 题，每小题 0.6 分，共 12 分)

- 51、骨癌或食道癌的晚期病人常有的左锁骨上淋巴结的肿大。()
- 52、阴道后穹与直肠子宫陷凹之间仅隔以阴道壁和腹膜。()
- 53、躯干、四肢痛、温触觉传导路的第二级神经元在延骨髓的薄束核和楔束核内。
- 54、血细胞比容是指血细胞与血管容积之比。()

- 55、组织发生化生，则意味着癌变。()
- 56、风湿小体是发生在心肌细胞上的变化坏死。()
- 57、干性坏疽好发于四肢，而湿性坏疽好发于与外界相通的内脏。()
- 58、受体激动剂是指与受体有较强亲和力和较强内在的活性的药物。()
- 59、克霉唑属广谱抗真菌药，但由于不良反应多，故主要是外用给药。()
- 60、瑞格列奈为胰岛素的增敏剂，能增强组织对胰岛素的敏感性而改善胰岛素抵抗。()
61. 人体内环境稳定性的维持是生命活动的基础。()
62. 生物膜是细菌定植和聚集的场所,其内可产生各种营养物质和代谢产物。()
63. 人体的血糖浓度受多种激素的协同调节。()
64. 肝细胞仅具有解毒作用。()
65. 免疫细胞产生的抗体可与同种抗原结合。()
66. 骨髓造血过程需要骨髓微环境的参与。()
67. T 淋巴细胞成熟过程需要经过胸腺。()
68. 血小板减少会引起出血时间延长。()
69. 动脉血氧浓度高于混合静脉血。()
- 70.心电图的 P 波代表心房的去极化复极化。()

科目二：综合应用能力测试

四、论述题(共 10 分)

71. 随着社会的发展,医疗资源的分配不平衡问题愈加严重。试分析医疗资源分配不均衡的社会影响及对策?

五、案例分析题(共 10 分)

[案例]

72.小王已婚 3 年,经常与夫人发生争执。某次发生激烈争吵后,小王突发强烈的心悸、胸痛和呼吸困难。小王夫人赶紧叫了 120 送医院。在急诊科检查后,医生告知小王可能患有心绞痛,需要住院观察及检查。之后经过检查,诊断为非典型心绞痛。医生提出出院后适当调整生活

作息,缓解压力等。几天后症状再次发作,小王遂到另一家医院检查,最终明确诊断为脑溢血。

[问题]

案例中医生和医院存在什么问题?

如何避免此类医疗差错?

你认为医院应采取什么措施加强医疗质量管理?

六、公文写作题(共 20 分)

73. 阅读材料,完成写作。

【材料一】

据调查显示,我国 40 岁以上的乡村医生超过 70%,有 33.26%的人拥有乡村医生执业证书,21.39%的人持有乡村助理医师执照。近 80%的乡村医生从业年限超过 10 年。同时农村面临着医疗资源的短缺,很多乡村医生把卫生室建在了自己的家里,卫生室与卧室、厨房混为一体,执业环境令人担忧。医疗诊断器械严重不足,检测仪器老化严重,缺乏现代化的医疗检测手段。

除了乡镇卫生院、卫生所有各科医生、护士、检验员,还有几张病床外,村里卫生室大多条件极其简陋,听诊器、血压计、体温计和几把镊子、剪子这些极为传统的简单器具就是全部家当。医生大多都是“多面手”,看病靠肉眼、诊病凭把脉,处置、护理一人兼任。乡村医生多数仅通过短期培训、考试和注册登记,本身业务培训、学习几乎是零,他们只能治疗一些发烧、感冒等常见小病。乡镇医院情况稍好一些,但仍然紧缺中高级专业职称技术人员,相当一部分医务人员的业务水平仅通过短期“充电”提高,村民想得到有效的治疗相当困难。

【材料二】

据卫生部进行的第三次全国卫生医疗调查显示:我国城乡居民应就诊而未就诊的比例由 1993 年的 36.4%上升到 48.9%;患者应住院而没有住院的比例高达 29.6%;在住院患者中,主动提出提前出院的比例为 43.3%,其中六成以上是因为支付不起相关费用而提前出院的;农民应住院而没有住院的比例更是从 1998 年的 63.7%上升到 75.4%;因病致贫、因病返贫的农民占全部贫困农民的 33.4%;在西部地区农村,62%的患者因为经济困难应治疗而没有治疗,75.1%的患者还没有治愈就要求提前出院。

【问题】阅读上述材料,你有什么感受?请根据材料,结合自身感悟与思考,自拟题目,写一篇文章。

- 要求：（1）自选角度，立意明确；
- （2）联系实际，不拘泥于给定材料；
- （3）思路清晰，语言流畅；
- （4）总字数 1000 字左右。

